

Lavande officinale/ lavande vraie

Lavandula angustifolia Mill.



Photo par Sylvie Baudino CC BY-SA

-  Arbrisseau de 40-80 cm
-  Hampe florale à 1 seul épi
-  Feuilles opposées décussées, simples et entières et lancéolées, gris vert.
-  Fleurs très aromatiques de couleur variable (violet pale à intense)
-  Les rameaux de fleurs sont généralement toujours simples.
-  Bractée ovale deux fois plus large que longue et bractéoles très réduites difficilement visibles à l'œil nu

Floraison de fin juin à mi-juillet

Native des montagnes sèches du sud de la France (entre 600 et 1400 m d'altitude).

Lavandin

Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel



Photo par Sandrine Moja CC BY-SA

-  Arbrisseau robuste de 1-1,5 m Plante plus grande que la lavande vraie
-  Hampe florale en forme de trident, porte 1 épi central et deux axillaires se terminant en pointe
-  Les feuilles, aromatiques, pédicellées, les plus grandes sont généralement inférieures à 5 mm de large
-  Fleurs de couleur bleutée d'intensité variable
-  Le parfum est plus fort que celui de la lavande officinale car riche en camphre et en eucalyptol
-  Bractées lancéolées et bractéoles larges visibles à l'œil nu

Floraison de fin juin à septembre (dans la nature)
 Hybride naturel entre 400 et 800 m d'altitude.

Lavande aspic

Lavandula latifolia Medik.



Photo par Patrick Ressayre CC BY-SA

-  Arbrisseau de 50-70 cm
-  Feuilles aromatiques, pédicellées, oblancéolées de 3 à 6cm de long et de moins d'un centimètre de large généralement mais plus large que celles de *L. angustifolia*.
-  Fleurs violet pâle
-  Inflorescence en Epi en pointe plus ou moins fournie et interrompue avec 2 épis secondaires plus petits
-  Les rameaux de fleurs sont majoritairement trifurqués. (= divisé en 3 en forme de trident)
-  Bractée lancéolée et bractéoles visibles à l'œil nu

Floraison de mi-juillet à aout

Native des garrigues du sud de la France (entre 100 et 800 m d'altitude) et très répandue en Espagne.

Lavande papillon

Lavandula stoechas L.



Photo par Paul Fabre CC BY-SA

-  Arbrisseau aromatique très ramifié
-  Feuille sessile
-  A maturité, l'inflorescence est plus de trois fois plus longue que large. **Elle est surmontée de bractées stériles violacées** (couleur plus ou moins intense)
-  La corolle est pourpre sombre, parfois noirâtre
-  Feuillage feutré blanc-gris dense

Floraison de février à juin

La sous-espèce *stoechas* est une espèce pionnière sur les zones brûlées ou perturbées (altitude de 0-1000 m). Très utilisée comme ornementale.



Lavande aspic
Lavandula latifolia Medik.

Lavandin
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel

Lavande officinale/ lavande vraie
Lavandula angustifolia Mill

Lavande papillon
Lavandula stoechas L.